

**Dr. med. Armand v. Lucadou**Internist  
Hepatologie  
OnkologieGibitzenhofstraße 37  
90443 NürnbergTel +49 (0) 911 480 9590  
Fax +49 (0) 911 418 49042  
Web internisten-nbg.de

## Aufklärungsbogen zur Punktion der Leber

### Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen liegt eine Erkrankung der Leber vor, die weiter abgeklärt werden soll. Es ist daher vorgesehen, ein kleines Stück Lebergewebe mit einer Nadel zu entnehmen, um es dann direkt unter dem Mikroskop untersuchen zu können. Dies kann dann wertvolle Hinweise auf die Art Ihrer Erkrankung oder ihres Stadiums geben. Dies ist für die weitere Therapie sehr wichtig.

### Punktion

Der Patient liegt zur Leberpunktion auf der Untersuchungsfläche. Mit Hilfe einer Ultraschalluntersuchung wird die zu untersuchende Region genau eingestellt, die Punktionsstelle auf der Haut markiert sowie der Stichkanal vermessen. Nach Desinfektion der Haut und nach örtlicher Betäubung wird eine Hohnadel an der eingezeichneten Stelle in die Leber vorgeschoben und dabei ein kleiner Gewebszylinder entnommen.

### Mögliche Komplikationen

Risikofreiheit kann kein Arzt für seine Maßnahmen garantieren. Selbst kleine Zwischenfälle können, wie jeder weiß, bei einer Verkettung unglücklicher Umstände zu schwerwiegenden Folgen führen. In der Regel handelt es sich bei einer Leberpunktion um einen komplikationsarmen Eingriff. Selten kann es durch Verletzung eines Blutgefäßes oder der Gallenblase zu einer Blutung in die Bauchhöhle bzw. zu einer Bauchfellentzündung kommen. Dies würde dann eine Klinikeinweisung notwendig machen und im Extremfall zu einer Operation führen. Gelegentlich wird durch die Reizung des Bauchfells oder durch Überempfindlichkeit auf das Betäubungsmittel ein Kreislaufkollaps ausgelöst.

### Verhalten vor dem Eingriff

Wenn die Punktion um 14.00 Uhr oder später erfolgt, darf noch gefrühstückt werden bzw. bis ca. 8.30 etwas gegessen werden. Danach bitte nichts mehr essen und trinken!!

### Verhalten nach dem Eingriff

Nach der Punktion sollten Sie ca. 1/2 Stunde auf der rechten Seite liegen, und mit der flachen Hand die Punktionsstelle komprimieren. Anschließend halten Sie sich noch für ca. 2 Stunden in der Praxis auf. Zum Ausschluss möglicher Komplikationen wird nach der Punktion nochmals eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes durchgeführt.

Es können nach der Punktion noch leichte ziehende Schmerzen im Punktionsbereich auftreten. Bitte verlangen Sie dann ein Schmerzmittel. Nach der Punktion sollten Sie sich zu Hause aufhalten.

*Bitte fragen Sie mich, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder mehr über den Eingriff wissen möchten.*

### Erklärung

Herr Dr. v. Lucadou hat mit mir heute anhand des Merkblattes ein Aufklärungsgespräch geführt, bei dem ich alle mich interessierende Fragen stellen konnte. Ich habe keine weiteren Fragen und benötige keine weitere Überlegensfrist. Ich willige hiermit in den vorgeschlagenen Eingriff sowie notwendige Folge- und Nebeneingriffe ein.

Datum: \_\_\_\_\_

Patient: \_\_\_\_\_