

**Dr. med. Armand v. Lucadou**Internist  
Hepatology  
OncologyGibitzenhofstraße 37  
90443 NürnbergTel +49 (0) 911 480 9590  
Fax +49 (0) 911 418 49042  
Web internisten-nbg.de

## Aufklärungsbogen zur Punktion der Rippenfellhöhle (Pleurahöhle)

### Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen hat sich Flüssigkeit in der Rippenfellhöhle (Pleurahöhle) angesammelt. Die Untersuchung der durch Punktion gewonnenen Flüssigkeit ermöglicht in der Regel Rückschlüsse auf die zugrundeliegende Erkrankung. Bei Kurzatmigkeit infolge der Flüssigkeitsansammlung dient die Punktion auch der Entlastung.

### Punktion

In der Regel sitzt der Patient zur Pleurapunktion auf der Bettkante oder auf einem Stuhl und wird durch eine vor ihm stehende Hilfsperson gestützt. Da bei der Punktion gelegentlich Hustenreiz auftritt, bekommt der Patient zuvor Hustenreizstillende Tropfen. Nach Desinfektion der Haut im Bereich des Brustkorbes und nach örtlicher Betäubung wird eine Hohnadel auf der kranken Brustkorbseite in den Pleuraraum vorgeschoben und Flüssigkeit abgezogen. Falls notwendig wird die Stelle durch eine Ultraschalluntersuchung festgelegt.

### Mögliche Komplikationen

Risikofreiheit kann kein Arzt für seine Maßnahmen garantieren. Selbst kleine Zwischenfälle können, wie jeder weiß, bei einer Verkettung unglücklicher Umstände zu schwerwiegenden Folgen führen. In der Regel handelt es sich bei einer Pleurapunktion um einen komplikationsarmen Eingriff. Selten kann es durch Verletzung eines Blutgefäßes zwischen den Rippen, zur Blutung oder durch Verletzung von Lungengewebe zu einem Kollaps der Lunge (Pneumothorax) kommen. Eine Saugdrainage kann dann zur Entfaltung der Lunge notwendig werden. Dies würde dann eine Klinikeinweisung notwendig machen. In extrem seltenen Fällen kann auch einmal die Leber oder Milz verletzt werden. Gelegentlich wird durch die Reizung des Rippenfells oder durch Überempfindlichkeit auf das Betäubungsmittel ein Kreislaufkollaps ausgelöst. Dann wird die Punktion abgebrochen und im Bedarfsfall ein Kreislaufmittel verabreicht.

Nach der Punktion sollten Sie ca. 1 Stunde liegen. Bitte, informieren Sie uns, wenn Sie Kurzatmigkeit (Luftnot) oder Schmerzen verspüren. Zum Ausschluss möglicher Komplikationen wird nach der Punktion eventuell nochmals eine Röntgenaufnahme der Lunge angefertigt.

*Bitte fragen Sie mich, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder mehr über den Eingriff wissen möchten.*

### Erklärung

Herr Dr. v. Lucadou hat mit mir heute anhand des Merkblattes ein Aufklärungsgespräch geführt, bei dem ich alle mich interessierende Fragen stellen konnte. Ich habe keine weiteren Fragen und benötige keine weitere Überlegensfrist. Ich willige hiermit in den vorgeschlagenen Eingriff sowie notwendige Folge- und Nebeneingriffe ein.

Datum: \_\_\_\_\_

Patient: \_\_\_\_\_